岩船米生育速報(7月13日現在)　号外

村上農業普及指導センター

コシヒカリの生育概況

草丈が急伸長、葉色濃く、倒伏の懸念

草丈：並　茎数：並　葉数：並～やや遅　葉色：やや濃い

○7月に入り、降雨や夜間気温が高いなどの影響で、**草丈は急伸長、葉色は濃い状態が続いている**。

週間予報では、高温で雨や曇りの日が多く、今後も葉色が濃く、草丈が長くなり、倒伏の危険性が懸念される。

○全県レベルで、カメムシ類のすくい取り確認地点率が平年より高く、7月13日県病害虫防除所から**「カメムシ類による斑点米の多発生注意報」**が発表された。特に下越地域ではカスミカメムシ類の多い状態が続いている。

当面の管理のポイント

コシヒカリ１回目穂肥は、生育診断に基づき慎重な施用を！

○7月20日頃まで曇天傾向で、長草軟弱傾向が続くと予想される。

コシヒカリの1回目穂肥は、生育診断に基づいて慎重な対応とする。

葉色が濃い場合は、施用時期を遅らせ、施用量も控え目にする。

○幼穂形成期以降は飽水管理とする。特に穂肥施用時はかん水して、施肥効果を高めるとともに施肥ムラを改善する。

カメムシ対策の徹底を！

○引き続き、畦畔農道等の草刈りを徹底する。また、**各品種ごとの出穂時期を確認し、適期を失しないように防除する**。

特に、早生は原則2回確実に薬剤防除する。

【コシヒカリ】

調査場所	田植	草丈(cm, %)			茎数(本/㎡, %)			葉数(葉)			葉色(SPAD値)		
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差
山北(大毎)	5/8	58	88%	82%	399	89%	86%	10.4	−0.4	−0.1	38.7	4.7	2.9
朝日(川端)	5/14	64	94%	91%	433	94%	99%	11.0	−0.6	−0.6	38.2	3.2	4.2
村上(山辺里)	5/17	68	101%	108%	465	103%	124%	10.9	−0.4	−0.4	40.6	6.6	−0.3
神林(牛屋)	5/10	66	102%	96%	407	95%	78%	10.8	−0.2	−0.6	36.2	3.2	3.2
荒川(名割)	5/16	62	93%	90%	444	103%	112%	10.8	−0.1	0.2	43.4	8.0	3.4
関川(下関)	5/10	66	100%	100%	449	100%	110%	10.5	−0.6	−0.2	39.1	3.6	−3.4
平均	5/12	65	98%	95%	433	98%	100%	10.8	−0.4	−0.3	39.0	4.5	2.0

○平均は水稲作付面積に応じて、加重平均を出しています。

☆コシヒカリの穂肥施用は幼穂１㎝と葉色・草丈を確認しよう☆

問い合わせ先:村上農業普及指導センター
TEL　:　0254-52-7930　E-mail　:　ngt111240@pref.niigata.lg.jp

次回は7月20日発行予定です。