

# R3 岩船米生育速報(6月30日現在)

村上農業普及指導センター

7/4以降は雨の予報！コシヒカリは今週末までにしっかり干し上げよう!!  
中干しは大ヒビ厳禁！出穂1か月前までに終了させよう!!

## 生育概況

**草丈：やや短～並 茎数：多 葉数の進み：やや早**  
**葉色：並～やや淡（茎数及び葉色は、ほ場間差大）**

- 気温が高めに推移しているが、中干し・溝切りの効果により、草丈の伸長や茎数の増加が緩やかになり、葉色が淡くなってきているほ場もある。
- 出穂期は、早生が平年に比べ2日程度、中生が平年に比べ1日程度早まる見込みである。
- 葉色は生育が順調であったほ場や地力の低いほ場で、やや淡くなり始めている。一発基肥ほ場では葉色が濃いほ場も見られる。

## 当面の管理のポイント

- ◎中干しが不十分なほ場は、生育後期の倒伏軽減及び品質向上のため、今のうちにしっかりと干しあげる。
- ◎茎数淘汰が始まり葉色が淡くなり始めたほ場は、中干しを終了する。
- ◎中干しは出穂1か月前までには終了し、間断かん水を行う。その後、出穂25日前からは飽水管理（水尻を止め、ためた水がなくなったらかん水する方法）に移行する。
- ◎コシヒカリは、出穂20～40日前に、ケイ酸肥料を追肥し、稲の体質強化と根の健全化を図る。
- ◎早生品種は、早めに幼穂を確認して1回目穂肥を遅れずに、適期・適量の穂肥施用により籾数確保を図る。

## 【コシヒカリ】

調査場所	田植日	草丈(cm, %)			茎数(本/m <sup>2</sup> , %)			葉数(葉)			葉色(SPAD値)		
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差
山北(大毎)	5/9	50	100%	104%	551	116%	116%	10.2	0.8	0.6	36.6	-0.4	0.1
朝日(川端)	5/11	56	108%	112%	629	134%	90%	10.8	0.8	0.6	38.1	-1.4	1.5
村上(鑄物師)	5/16	48	95%	113%	600	120%	116%	10.7	0.8	1.2	39.1	3.1	1.0
神林(牛屋)	5/10	48	100%	96%	416	87%	80%	9.9	0.3	-1.0	31.6	-4.4	-3.1
荒川(名割)	5/14	42	98%	91%	593	165%	110%	10.0	0.6	0.4	38.7	-0.3	-1.2
関川(下関)	5/11	42	89%	108%	533	133%	130%	9.6	0.0	0.1	37.1	-1.9	1.5
平均	5/11	46	96%	103%	552	130%	109%	10.1	0.5	0.3	37.1	-0.5	-0.2

○平均は水稻作付面積に応じて、加重平均を出しています。

問い合わせ先:村上農業普及指導センター

TEL : 0254-52-7930 E-mail : ngt111240@pref.niigata.lg.jp